

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveystoimisto PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp  ANVISNING		Sida 1 (1)
Namn <b>BCG BEHANDLING AV URINBLÅSAN</b>	Uppgjord av: kir pkl enhetens namn Datum: 25.3.11	Godkänd av:C.P Namn Datum:28.3.11	Reviderad av: enhetens namn Datum: 7.9.2018
Vård/förfaringssätt  <p><b>Indikationer och föruppgifter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BCG (levande försvagade tuberkelbakterier) används vid behandling av urinblåsecancer.</li> <li>➤ Behandlingen ges enligt läkarordination. Vanligen en gång per vecka i 6 veckor. Därefter en gång per månad i ett års tid, alternativ fortsättning är en gång per vecka i 3 veckor var tredje månad.</li> <li>➤ Patienten bör vara odrucken 4 timmar före samt under behandlingen.</li> </ul> <p><b>Tillvägagångssätt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Personalen bör ha skyddshandskar, ansiktsmask och plastförkläde.</li> <li>➤ Patienten katetriseras med enkångskatater Ch12 med Luerlock.</li> <li>➤ Urinprov tas via katetern. Behandling får ej ges om patienten har bakteriell urinvägsinfektion.</li> <li>➤ BCG-medac 50 ml instilleras via katetern. Läs noga igenom tillverkarens instruktioner. Katetern dras efter instillationen. Patientens genitalier duschas vid ev spill. Patienten får gå hem efter instillationen om han så önskar.</li> <li>➤ Patienten håller medicinen i blåsan i två timmar. Under tiden bör patienten byta läge var 15 min så att hela blåslemhinnan kommer i kontakt med medicinen.</li> <li>➤ Patienten urinerar ut medicinen efter två timmar.</li> <li>➤ Patienten bör tvätta genitalierna och händerna varje gång han urinerar det första dygnet efter behandlingen.</li> </ul>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: www.terveysportti.fi BCG-medac patientinformation. 2008 Pharmaca Fennica. 2011.			