

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp PATIENTANVISNING		Sida 1 (2)
Namn GEPAN BLÅSSKÖLJNING	Uppgjord av: kir.pkl Datum: 7.4.2014	Godkänd av:C.P. Datum:24.4.2014	Reviderad av: Datum: 7.9.2018
Vård/förfaringssätt <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gepan används vid kronisk inflammation i blåsväggen, t.ex interstitiell cystit, överaktiv urinblåsa eller strålningscystit. ➤ Medicinen har effekt på det skyddande skiktet som täcker urinblåsans insida. ➤ Gepan ges oftast en gång per vecka under 4-6 veckor varefter man fortsätter med en gång per månad upp till 12-18 månader. ➤ Du bör urinera strax före behandlingen så att urinblåsan är tom när medicinen införs. Vid behandlingen införs 40 ml av medicinen via kateter. Medicinen får vara i blåsan så länge som möjligt men minst 30 min. Därefter får du urinera normalt. ➤ Behandlingen har inga kända biverkningar. <p>Vid ev. frågor kontakta kirurgiska poliklinikens sjukskötare måndag – fredag kl 8-9 Tfn (06) 786 2245, *786 1111</p>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: www.terveysportti.fi Gepan@instill bruksanvisning			

