

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosaali- ja terveystervasto PIETARSAARI</p>	Asiakirjatyyppe POTILASOHJE		Sivu 1 (1)
Nimi <b>ETURAUHASEN KOEPALAN OTTO</b>	Laatinut: Kir.pkl Pvm: 25.3.2011	Hyväksynyt: C. Palmberg Pvm: 28.3.2011	Päivitetty: Kir.pkl Pvm: 14.4.2015
Hoito-/menettelyohje <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eturauhasen neulabiopsiassa otetaan kudospnäyte eturauhaskudoksesta peräsuolen kautta.</li> <li>➤ Näytteenoton aikana makaat selällä jalat jalkatuissa.</li> <li>➤ Mikäli käytät verenhennuslääkkeitä Marevan, Plavix, Clopidogrel, Xarelto tai Brilique, tulee sinun ottaa yhteyttä kirurgiseen poliklinikkaan. Mikäli käytät Aspirin, Primaspan tai Disperiniä saat ottaa ne tavalliseen tapaan.</li> </ul> <p><b>Verenvuotoa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verenvuotoa voi tulla virtsatessa tai peräsuolesta muutamia päiviä koepalan otton jälkeen. Veristä siemennestettä voi esiintyä noin kaksi kuukautta koepalanotosta. Välttääksesi räsitusä tai saunomista näytteenottopäivänä. Särkylääkkeeksi voit ottaa tarvittaessa Panadolin.</li> </ul> <p><b>Tulehdus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ennen näytepalan ottoa saat antibioottitabletin tulehdusta estämään. Jos kuitenkin saat virtsatietulehduksen ja korkean kuumeen otton jälkeen, hakeutukaa sairaalaan.</li> </ul> <p><b>Jatkohoito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vastaus tulee 2-3 viikon kuluessa, jolloin saat lääkäriltä kirjeen mistä selviää koetulos ja mahdollinen jatkohoito.</li> </ul> <p>Mahd. kysymyksissä ota yhteyttä kirurgisen poliklinikan sairaanhoitajaan  maanantai - perjantai klo 8-9.  Puh.(06) 786 2245, *786 1111</p>			
Viitteet/lisätiedot:			
www.terveysportti.fi			