

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveysvirasto PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp PATIENTANVISNING		Sida 1 (2)
Namn DMSO BLÅSSKÖLJNING	Uppgjord av: kir.pkl enhetens namn Datum: 25.3.11	Godkänd av:C.P. Namn Datum:28.3.11	Reviderad av: enhetens namn Datum: 7.9.2018
Vård/förfaringssätt <p>➤ DMSO används vid en form av kronisk inflammation i blåsväggen, s.k. interstitiell cystit.</p> <p>➤ Medicinen har en anti-inflammatorisk och smärtstillande effekt och gör att urinblåsans vägg slappnar av.</p> <p>➤ DMSO ges oftast en gång per vecka under 4-5 veckor varefter man fortsätter med en gång per månad upp till 6-12 månader.</p> <p>➤ Du bör urinera strax före behandlingen så att urinblåsan är tom när medicinen införs. Vid behandlingen bedövas blåsan först varefter 50 ml av medicinen införs via kateter. Medicinen får vara i blåsan 30 min varefter du får urinera normalt.</p> <p>➤ Efter sköljningen kan man känna smärta i urinblåsan eller svavelsmak i munnen.</p> <p>Vid ev. frågor kontakta kirurgiska poliklinikens sjukskötare måndag – fredag kl 8-9. Tfn (06) 786 2245, * 786 1111</p>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: www.terveysportti.fi			

